

Памятка пострадавшему от укуса клеща.

1. В случае обнаружения присосавшегося клеща на теле, пациенту до 18-и лет и старше необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в одно из следующих учреждений:

- травматологический пункт БУ «Нижевартовская городская поликлиника» по адресу Нефтяников, 9, поликлиника №1, кабинет 124, работает круглосуточно
- травматологический пункт БУ ХМАО-Югры «Нижевартовская окружная детская клиническая больница» по адресу: ул. Северная, 30 (круглосуточно),
- хирургический кабинет детской поликлиники №5 – ул. Дзержинского д.8-а, телефон регистратуры: 43-46-95 (в часы приема),
- хирургический кабинет детской поликлиники №2 - ул. 60 лет Октября д.51, телефон регистратуры: 44-04-80 (в часы приема).

2. При отсутствии полного курса профилактических прививок против клещевого энцефалита пациенту будет введён противоклещевой иммуноглобулин.

3. Удалённого клеща (при самостоятельном удалении клеща также необходимо сохранить в какой – либо емкости) нужно доставить в лабораторию для исследования на клещевые инфекции.

Доставить клеща для платного исследования можно в лабораторию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская 15, время работы: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, тел. 61-32-47 (либо в один из офисов частных медицинских лабораторий, например INVITRO, Гемотест).

Проводимые исследования:

- Исследование клещей методом ПЦР проводится на 4 инфекции (вирус клещевого энцефалита, боррелии, анаплазмы и эрлихии). На исследование принимают живых или погибших клещей и даже их фрагменты (частички). Время проведения исследования – не более 3-х рабочих дней. Анализ платный.

4. После удаления клеща обязательно нужно обратиться к врачу – инфекционисту или врачу – педиатру детской поликлиники для назначения антибиотиков с целью профилактики иксодового клещевого боррелиоза и организации медицинского наблюдения. В течение 21 дня ежедневно измерять температуру тела пострадавшего, избегать переохлаждения. В случае повышения температуры тела, острой головной боли, боли в области шеи, спины, тошноты, рвоты или других симптомов заболевания следует срочно обратиться за медицинской помощью.